

Data:

Godzina:

Lekarz:

14 dni przed planowanym terminem badania, jeżeli lekarz kierujący nie zaleci innego postępowania należy odstawić:

- leki zobojętniające kwas żołądkowy tj.: Alugastrin, Rennie, Manti, Gaviscon
- leki hamujące produkcję kwasu tj.: IPP, Controloc, Omeprazol (Prazol), Pantoprazol (Anesteloc, Nolpaza), Esomeprazol, Ranigast

3 dni przed planowanym badaniem należy po uprzedniej konsultacji z lekarzem kierującym lub kardiologiem odstawić:

- leki przeciwzakrzepowe np.: Sintrom, Xarelto, Warafin, Eliquis, Pradaxa
- leki przeciwplatekcyjne np.: Plavix, Areplex, Acard, Polocard, Aspiryna, Zylt, Efient, Brylique
- pamiętaj o konieczności dostarczenia zaświadczenia od lekarza kierującego bądź kardiologa informującego nas o odstawionych lekach

W dniu badania należy pozostać minimum:

- 6 godzin na czczo (bez jedzenia)
- 3 godziny bez picia

Od rana nie należy spożywać kawy, produktów mlecznych, napojów gazowanych i **nie wolno** palić papierosów

W dniu badania w znieczuleniu ogólnym należy pozostać minimum 6 godzin na czczo (bez jedzenia), 3 godziny bez picia

- ▶ Jeśli przyjmujesz leki przeciwcukrzycowe skonsultuj z lekarzem POZ odstawienie leków zgodnie z dołączonymi rekomendacjami.
- ▶ W przypadku gdy przyjmujesz leki zlecone od kardiologa, przed badaniem udaj się na konsultację kardiologiczną ze względu na konieczność odstawienia niektórych leków przed badaniem/znieczuleniem.

Na badanie **należy przynieść wyniki** poprzednich gastrokopii i/lub badań dodatkowych.