

Data:

Godzina:

Lekarz:

3 dni przed planowanym badaniem należy po uprzedniej konsultacji z lekarzem kierującym lub kardiologiem odstawić:

- leki przeciwzakrzepowe np.: Sintrom, Xarelto, Warafin, Eliquis, Pradaxa
- leki przeciwplatekcyjne np.: Plavix, Areplex, Acard, Polocard, Aspiryna, Zylt, Efient, Brylique
- pamiętaj o konieczności dostarczenia zaświadczenia od lekarza kierującego bądź kardiologa informującego nas o odstawionych lekach

3 dni przed planowanym badaniem należy nie spożywać:

- warzyw i owoców pestkowych,
- pestek (siemę lniane, mak, słonecznik itp.),
- ciemnego pieczywa,
- napojów gazowanych

3 dni przed badaniem zalecane jest spożywanie: gotowanego mięsa i ryb, ryżu, makaronu diety półpłynna (zupy), jogurty, galaretki, kisiele, herbata, woda mineralna niegazowana, dowolna ilość kawy, herbaty, soków bez miąższu owocowego

Oczyszczanie

Preparat, który otrzymasz na receptę od lekarza przyjmuj zgodnie z dołączoną instrukcją.

Jeśli badanie jest w godzinach porannych, przed godziną 12:00 pij preparat wieczorem w dniu poprzedzającym.

Jeżeli badanie jest zaplanowane po godzinie 12:00 podziel dawkę preparatu na 2 porcje: jedną wypij wieczorem dzień wcześniej; drugą w dniu badania pijąc preparat do 5 godzin przed badaniem. Od momentu rozpoczęcia oczyszczania należy już nie jeść – można pić wodę.

W dniu badania w znieczuleniu ogólnym należy pozostać minimum 6 godzin na czczo (bez jedzenia), 3 godziny bez picia

- ▶ Jeśli przyjmujesz leki przeciwcukrzycowe skonsultuj z lekarzem POZ odstawienie leków zgodnie z dołączonymi rekomendacjami.
- ▶ W przypadku gdy przyjmujesz leki zlecone od kardiologa, przed badaniem udaj się na konsultację kardiologiczną ze względu na konieczność odstawienia niektórych leków przed badaniem/znieczuleniem.

Na badanie **należy przynieść wyniki** poprzednich kolonoskopii i/lub badań dodatkowych.